

Выигрышная комбинация

Комбинированная коррекция возрастных изменений с помощью ботулотоксина типа А на примере препарата «Релатокс», ФГУП НПО «Микроген» (Россия) и полиревитализирующего комплекса NCTF 135 Лабораторий Filorga (Франция).

Введение

В последнее время востребованность комбинированных методов коррекции в эстетической косметологии продолжает расти. Это обусловлено основным требованием, предъявляемым нашими пациентами к процедуре: она должна быть эффективной, т. е. гарантировать быстрый и выраженный результат, существенно улучшить внешний вид и иметь длительный эффект.

Одновременно мы воздействуем на тонус, тургор и морфофункциональное состояние кожи посредством мультикомпонентного высокоеффективного мезококтейля, тем самым осуществляя длительную стимуляцию репаративных процессов на уровне дермы.

Показания

Мы рекомендуем отдать свой выбор процедуре комбинированной коррекции у пациентов с заломами, складками и мелкими морщинами в сочетании с выраженным снижением тонауса, тургора кожи, пигментными пятнами и другими кожными проявлениями возрастных изменений.

Процедура будет несомненно востребована у социально активных пациентов, которые стремятся минимизировать количество посещений клиники эстетической медицины.

Противопоказания

Вспомогательные изменения кожи в области проводимой процедуры, аутоиммune заболевания, острый период инфекционных заболеваний, субфебрилитет, беременность и период лактации.



Пациентка до процедуры

Наша цель — обеспечить химическую денервацию мимической мускулатуры с помощью ботулотоксина, что дает великолепную основу для работы с кожей, устраняя или существенно уменьшая мимический стресс дермы, приводя к быстрому разглаживанию морщин.

Пациент

Пациентка А., 48 лет. Предъявляет жалобы на прогрессирующие возрастные изменения: мимические морщины, особенно в первоюбортальной области и в области гlabelолы, тусклый цвет лица, сухость кожи, опускание латеральных отдалов бровей и появление избытка кожи верхнего века. Отмечает некоторую отечность и пастозность первоюбортальной области в течение часа. Ранее ей уже вводился ботулотоксин, препарат «Релатокс», результатом была довольна, отмечает выраженный эффект на протяжении не менее 6 месяцев. Мелотерапевтические препараты, полиревитализирующие коктейли и биоревитализанты ранее не вводились.

Цель коррекции

Добиться заэвации латеральных концов бровей и уменьшить кожную складку верхнего века, уменьшить подвижность латеральной части круговой мышцы глаза, вследствие чего существенно уменьшить глубину морщин латеральной и нижнелатеральной частей периорбитальной области, убрать темные крути под, газами, уменьшить пигментные пятна, добиться улучшения общего тонауса, тургора кожи и обеспечить стимуляцию репаративных процессов в дерме на длительный период с накопительным эффектом и отсроченным положительным результатом.

Обоснование выбора процедуры и препаратов

На основании данных анамнеза, особенностей анатомического строения состояния кожи пациентки и ее ожиданий от процедуры эстетической коррекции мы остановили свой выбор на процедуре комбинированной терапии с целью достижения выраженного и стойкого эстетического улучшения и при этом минимизации числа посещений клиники эстетической медицины.

В качестве основы для долгосрочной программы ведения пациента мы решили ввести ботулотоксин для химической денервации мимической мускулатуры, для быстрого, стойкого и выраженного результата. Свой выбор



Препарат Релатокс



Препарат NCTF 135 HA+



Восстановление препарата Релатокс



Лоток с инсулиновыми шприцами



Юлия Кац


врач-дерматовенеролог, косметолог,
сертифицированный тренер по инъекционным
методикам, главный врач клиники «Бьюти Альянс
ЮГ», Краснодар

мы остановили на препарате «Релатокс»* (ФГУП «НПО Микроген» Минздрава России) ввиду эффективности его миорелаксирующего действия, хорошей переносимости и длительности сохранения результата.


В качестве препарата для долгосрочного ведения пациента мы выбрали NCTF 135 НА+ (Laboratoires Filorga, Франция). Данный препарат представляет собой полиревитализирующий комплекс из 53 активных ингредиентов и свободной гиалуроновой кислоты (10 мг/мл) молекуллярной массой 1,4 млн Да. Препарат дает быстрый, оптимальный, стойкий результат и отсроченную стимуляцию всех репаративных процессов в герме, восполняет запасы гиалуроновой кислоты в дерме, улучшает микроциркуляцию. При этом исключена вероятность отечности и пастозности периорбитальной области, папулы визуализируются не более 24 часов, что особенно существенно для социальных активных и взыскательных пациентов.

Протокол коррекции

1. Восстановление препарата «Релатокс» с помощью 2 мл физиологического раствора. Наш выбор был отдан препаратуре «Релатокс» ввиду высокой миорелаксирующей активности, быстроте наступления результата, высокой степени очистки (как следствие, минимальный риск возникновения аллергических реакций), хорошей переносимости и экономической целесообразности.
2. Для данной пациентки мы решили взять 42 ЕД препарата «Релатокс»: 12 ЕД — область глазбледам, 14 ЕД — периорбитальная область на обе стороны, 4 ЕД — область крыльев носа, 12 ЕД — область овала лица. Мы набрали препарат в разные инсулиновые шприцы из расчета 1 шприц на 1 зону. Для удобства дозирования мы использовали инсулиновые шприцы 50 ВД.
3. Введение препарата «Релатокс» по зонам:
 - межбровье: 4 ЕД препарата вводится в т. procerus, также по 4 ЕД вводится в проекции т. corrugator supercilii, инъецируя как ее медиальные, так и латеральные отделы. При этом в медиальных отделах рекомендуется вводить препарат глубоко, располагая иглу строго вертикально, уровень введения — очень глубоко в ткани, а в латеральных — поверхностно интрандермально.
 - периорбитальная область: препарат вводится субдермально, направление иглы от глазного яблока кнаружи. В латеральных отделах области — 5 ЕД в две точки введения: в проекции комиссюры глаза 2,5 ЕД и в области конца брови 2,5 ЕД, отступив не менее 1 см от костного края орбиты. В нижнелатеральных отделах орбиты вводится по 2 ЕД препарата в 4 точки введения: по 0,5 ЕД в каждую точку в технике дермальной папулы.



Обработка зоны межбровья



Обработка зоны орбиты

Обработка периорбитальной области препаратором NCTF 135 НА+



Обработка нижней трети лица



Пациентка после процедуры



- нижняя треть лица: препарат «Релатокс»* вводится в т. platysma на уровне края нижней челюсти очень поверхностно интрандермально по 2 ЕД в каждую точку, при этом необходимо выполнить 3 точки вкода.
- 4. Забор препарата NCTF 135 НА+ осуществляется при помощи прилагавшихся в пакете с препаратором шприца 3 мл с замком Люэрса и иглы 18G. Для обработки кожи лица, шеи и декольте необходимо использовать 1 флакон препарата объемом 3 мл. При этом возможно использование любых техник введения.
- 5. Препаратор NCTF 135 НА+* вводится в технике дермальных папул, при этом рекомендуемой техникой будет являться микропапульная. Особое внимание уделяется проблемным зонам: периорбитальной, периоральной, морщинам в области овала в проекции т. risorius. Препаратор имеет довольно плотную текстуру, что позволяет прорабатывать им морщины по всей длине вкод без промежутков, а в области нижнего века — максимально близко к реиничному краю без риска возникновения отечности и пастозности в первые 24 часа после введения.

Результат коррекции

Осмотр пациентки спустя 2 недели продемонстрировал выраженную элевацию бровей, уменьшение выраженностии мимических морщин, улучшение линии овала лица. Кожа увлажнена, тон ее более ровный.

Пациентке рекомендовано продолжить процедуры полиревитализации препаратом NCTF 135 НА+, для чего необходимо провести еще 4 процедуры с интервалами 14 дней. По окончании курса мы сможем увидеть выраженный и стойкий результат. ○

«Релатокс»

Ботулинотерапия на сегодняшний день является самой востребованной методикой в эстетической медицине ввиду высокой эффективности, малой травматичности, великолепного накопительного действия в целом на кожу лица и ввиду этого имеет профилактическую составляющую. Количества осложнений после введения ботулинотоксина является невысоким, и они не влекут за собой негативных последствий для внешности и здоровья, а также легко поддаются лечению. На сегодняшний день мы имеем в своем арсенале пять зарегистрированных препаратов ботулинотоксина типа А.

Хотелось бы остановиться на отличительных особенностях действия препарата «Релатокс» производства МПОУ «Микроген».

Препарат «Релатокс» обладает высокой миорелаксирующей активностью, которая, исходя из нашей практики

применения препарата, превосходит другие препараты ботулинотоксина типа А, представленные на фармакологическом рынке Российской Федерации. Кроме этого, препарат показывает большую продолжительность миорелаксирующего действия, что, несомненно, отвечает запросам подавляющего большинства наших пациентов и дает высокую удовлетворенность эстетическим результатом как со стороны врача, так и со стороны пациента. Также препарат характеризует высокую степень очистки, что является важнейшей характеристикой для врача эстетической медицины. Существенным фактором является экономическая целесообразность применения препарата и стабильность ценовой политики в условиях нестабильности внешнеэкономических факторов.

Препарат «Релатокс», несомненно, является препаратом выбора при проведении процедур комбинированной

терапии. Основным запросом пациентов, которым мы чаще всего предлагаем процедуры сочетанного введения, является быстрый и выраженный результат, именно поэтому мы столь активно и эффективно используем его в этих протоколах. Кроме этого, именно препарат «Релатокс» возможно использовать в небольших дозировках, поэтому он особо привлекателен для комбинированной терапии. Кроме этого, он прекрасно переносится пациентами, не дает аллергических реакций и позволяет провести сочетанное введение как с группой полиревитализантов (наш выбор — препарат NCTF 135 НА+), так и, безусловно, с дермальными филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Именно такие процедуры позволяют вам достичь выраженного и стабильного эстетического улучшения с накопительным результатом.